

Mise en œuvre de l'aménagement de la forêt domaniale (FD) LES PRIEURES et tableau de bord des indicateurs de suivi

Présentation de l'aménagement

- Période couverte par le document de gestion durable (aménagement) : 2004-2023
- Surface : 5208 ha
- Traitement en futaie régulière sur 5160 ha, en futaie irrégulière sur 19 ha.
- Principale essence : chêne sessile (83%).

Tableau de bord des indicateurs de suivi

Biodiversité

- Nombre d'arbres bio identifiés : Trame d'arbres à haute valeur écologique conservés en martelage ; 211 arbres « bio ».
- Surface en RB : Un site Natura 2000 (2 378 ha) sur les massifs de Moladier, Messarges et la moitié du massif de Bagnolet. Types d'habitats : Landes acidiphiles subatlantiques sèches à sub-sèches (0,6ha), Hêtraies-chênaies atlantiques acidiphiles à Houx (114ha), Hêtraies-chênaies subatlantiques collinéennes à Mélique ou à Chèvrefeuille (2 235 ha), Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée (33ha), Aulnaies-Frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux (2,8ha), Chênaies-Ormaies à frêne oxyphylle (0,35ha).
- Surface en HSN-LE : 243.46 ha
- Surface en ILS : 118,06 ha
- Surface en ILV : 88,83 ha

Dialogue forêt-société et accueil du public

- Accueil du public : 10 animations programmées en 2022.
- Concertation avec les parties prenantes : 1 comité de massif, 10 réunions chasse (une annuelle avec tous les locataires + les rencontres préalables), rencontre avec des associations (CEN, LPO) x 5, 1 COPIL N2000...

Renouvellement des forêts / Gestion durable

- Régénération naturelle : 128 ha mis en régénération naturelle en 2021 (surface classe 1 BDR en 2021)
- Plantation (depuis 2012) : 18.1 ha de plantation en 2021

Production

- Volume de bois mis à disposition du public pour tous usages : 45322 m3
- Volumes accidentels et sanitaires : 22458 m3 de produits accidentels déperissant
- Destination des bois : Les grandes orientations commerciales sont : 71% en ventes publiques, 13% en contrats d'approvisionnement, 13% en ventes amiables et 3% en cessions aux particuliers. Tous les résineux sont vendus en contrat. Le bois d'œuvre est acheté surtout par Chêne-Bois

Risques

- Protection contre les incendies de forêts : Organisation d'un exercice feu de forêt du SDIS ; de 0 à 4 tournées de prévention organisées durant l'été (en fonction du risque incendie) ; pas de travaux programmés pour l'entretien du massif en vue de la DFCI ; Surveillance des indices feu pendant la période estivale ; réunion avec les chefs de groupements territoriaux du SDIS
- Dépérissement des peuplements : Martelage des produits accidentels dépérissant dans les parcelles de GB et de BM. Diagnostic sylvicole et sanitaire de 196 ha en 2022

Equilibre forêt gibier

- Etat de la régénération : Equilibre forêt gibier respecté sur 100% des surfaces sensibles à la dent du gibier
- Surfaces protégées contre le gibier : Protection individuelle de 12660 plants mis en place hiver 2021/2022.

Eau

- Prise en compte des enjeux eau :
 - Intégration dans les contrats d'exploitation et de travaux de prescriptions en matière de protection d'espèces protégées et de sites archéologiques.
 - Aménagement des ouvrages d'art pour l'accueil des chauves-souris (passage busé sous le pont p427/430/433).
 - Réduction de l'impact des dessertes forestières sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire (« crapauduc » à Messages).
 - Maintenir le houx et le lierre en sous-bois.
 - Organiser les dégagements de semis, ainsi que les entretiens de cloisonnements par broyage autant que possible tardivement, à partir du 1er août dans l'optimum, afin de préserver notamment les nidifications d'oiseaux en période printanière.
 - Maintenir des éléments du sous-étage et notamment des espèces arbustives telles que le Houx, le Fragon petit houx, l'Aubépine, le Néflier, l'Alisier, le Cormier...dans les coupes de régénération, lors des relevés de couverts, et dans les coupes d'ensemencement.
 - Veiller à ne pas laisser de rémanents de coupes susceptibles de créer des embâcles.
 - Eviter le débardage et le nivellement des ornières d'avril à juillet, période de reproduction du Crapaud sonneur à ventre jaune. (Eau et Biodiversité)